

CLOSALBEN

USO VETERINÁRIO

AGITE BEM ANTES DE USAR

ENDOPARASITICIDA EM DOSE ÚNICA PARA OVINOS E CAPRINOS

SUSPENSÃO ORAL

FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Albendazole.....3,80 g
Closantel.....7,50 g
Excipiente.....q.s.p100,00 mL

INDICAÇÕES PRINCIPAIS:

Eficaz no combate e prevenção às infestações por Nematódeos (vermes gastrintestinais e pulmonares) dos gêneros: *Haemonchus sp.*, *Trichostrongylus sp.*, *Ostertagia sp.*, *Cooperia sp.*, *Nematodirus sp.*, *Trichuris sp.*, *Oesophagostomum sp.*, *Dictyocaulus sp.*, Trematódeos (*Fasciola hepatica*) e Cestódeos (*Moniezia sp.*) em ovinos e caprinos.

MODO DE USAR:

Via oral, com auxílio de pistola dosificadora.

POSOLOGIA:

A "Tabela de Dosificação" é orientada conforme o agente causal da infestação. Casos de infestações múltiplas, deve-se considerar a maior posologia.

| PARASITA | DOSE CLOSALBEN | REG.DE TRATAMENTO |
|---|---------------------|-------------------|
| Nematódeos e Cestódeos (Vermes gastrintestinais, pulmonares e <i>Moniezia sp.</i>). | 1 mL/10Kg | Dose única |
| Trematódeos (<i>Fasciola hepatica</i>). | 1,5 mL/10 kg | Dose única |

OBS: Qualquer alteração na posologia e/ou tratamento acima mencionados fica a critério e sob orientação do Médico Veterinário.

PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÕES DE USO:

Deve transcorrer o prazo de 2 (duas) semanas entre o último tratamento e o abate dos animais destinados ao consumo humano. Não administrar em fêmeas em lactação cujo leite seja destinado ao consumo humano.

Não administrar durante os 45 dias iniciais de gestação, em fêmeas em lactação ou nos 45 dias após parto.

VENDA SOB PRESCRIÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.
CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 6548 em 13/10/98.
Responsável Técnico: Dr. Mauricio Del Bigio - CRMV-SP nº 3715.