



## USO VETERINÁRIO

*CARRAPATICIDA, MOSQUICIDA, BERNICIDA,  
SARNICIDA, PIOLHICIDA E REPELENTE.*

### FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:

Cipermetrina .....	5,00g
Clorpirifós.....	7,00g
Butóxido de Piperonila.....	5,00g
Citronelal.....	0,50g
Veículo.....q.s.p.....	100,00 mL

### INDICAÇÕES:

**CYPERCLOR PLUS POUR ON** está indicado no controle e no tratamento das infestações causadas pelos principais ectoparasitas de bovinos e suínos, a saber:

**Bovinos:** Carrapatos (*Amblyomma cajenense*, *Anocenthor nitens*, *Boophilus microplus*, *Rhiphicephalus sanguineus*), moscas (*Dermatobia hominis*, *Musca autumnalis*, *Musca domestica*, *Musca spp.*, *Stomoxys calcitrans* e *Tabanus spp.*), inclusive a mosca dos chifres (*Haematobia irritans*), berne bovino (larvas de *Dermatobia hominis*), ácaros da sarna (*Chorioptes bovis*, *Notoedres cati*, *Psoroptes natalensis*, *Psoroptes sp.* e *Sarcoptes scabiei var. bovis*), piolhos mastigadores (*Damalinea bovis*) e piolhos sugadores (*Haematopinus euristernus* e *Linognathus vituli*) dos bovinos, possuindo ainda um bom poder de repelência sobre os insetos que parasitam os bovinos.

**Suínos:** Moscas (*Dermatobia hominis*, *Haematobia irritans*, *Musca domestica*, *Musca spp.*, e *Stomoxys calcitrans*), berne (larvas de *Dermatobia hominis*) e sarna (*Sarcoptes scabiei var. suis*).

### VIA DE ADMINISTRAÇÃO, MODO DE USAR E POSOLOGIA:

**CYPERCLOR PLUS POUR ON** é um produto de uso tópico, contendo 50 g/L de cipermetrina, 70 g/L de clorpirifós, 50 g/L de butóxido de piperonila e 5 g/L de citronelal, pronto para ser aplicado em todo o dorso do animal (fio do lombo), de forma homogênea, desde o pescoço até à cauda.

**Bovinos:** Aplicar 10 mL de **CYPERCLOR PLUS POUR ON** para cada 100 kg de peso corporal, de modo que os animais recebam pelo menos uma dose de 5 mg de cipermetrina por kg de peso corporal, de 7 mg de clorpirifós por kg de peso corporal, de 5 mg de butóxido de piperonila por kg de peso corporal e de 0,5 mg de citronelal por kg de peso corporal, conforme a tabela abaixo:

<b>PESO DO ANIMAL</b>	<b>DOSE CYPERCLOR PLUS POUR ON</b>
Até 100 kg	10 mL
De 101 a 200 kg	20 mL
De 201 a 300 kg	30 mL
De 301 a 400 kg	40 mL
De 401 a 500 kg	50 mL

**Suínos:** Aplicar 5 mL de **CYPERCLOR PLUS POUR ON** para cada 100 kg de peso corporal, de modo que os animais recebam pelo menos uma dose de 10 mg de cipermetrina por kg de peso corporal, de 14 mg de clorpirifós por kg de peso corporal, de 10 mg de butóxido de piperonila por kg de peso corporal e de 1,0 mg de citronelal por kg de peso corporal, conforme a tabela abaixo:

<b>PESO DO ANIMAL</b>	<b>DOSE CYPERCLOR PLUS POUR ON</b>
Até 50 kg	2,5 mL
De 51 a 100 kg	5,0 mL
De 101 a 150 kg	7,5 mL
De 151 a 200 kg	10,0 mL
De 201 a 250 kg	12,5 mL
De 251 a 300 kg	15,0 mL

#### **INTERVALO ENTRE DOSES:**

O intervalo entre as aplicações varia de acordo com o programa adotado no controle dos ectoparasitas, condições ambientais, nível de infestação e taxa de reinfestação do rebanho, a critério do Médico Veterinário.

#### **CONTRA INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:**

Não utilizar o produto em fêmeas em estado avançado de gestação. Animais fracos, doentes ou com problemas hepáticos são mais sensíveis à possibilidade de intoxicação.

#### **PRECAUÇÕES:**

Manter a embalagem fechada. Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Não aplicar em dias muito quentes, quando os animais podem se lamber e apresentar sintomas variáveis de intoxicação. Produto tóxico para peixes. Lavar o úbere das vacas tratadas antes da ordenha. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto. Lavar as mãos após o manuseio do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Mantenha este, ou qualquer outro medicamento, fora do alcance de crianças e animais domésticos. A utilização do produto simultaneamente a outros medicamentos à base de organofosforados e carbamatos deve ser avaliada e observada atentamente pelo médico veterinário, para prevenir a ocorrência de intoxicações. Não utilize nem guarde perto de bebidas, alimentos, medicamentos, produtos de higiene doméstica e do fogo. Manter a embalagem fechada. Não lavar as embalagens vazias para evitar a contaminação de rios e açudes. Não reaproveitar as embalagens vazias, que devem ser destruídas por incineração.

Primeiros socorros: Em caso de intoxicação acidental, procurar imediatamente o médico. Não provocar vômito e não oferecer leite, gorduras ou óleos ao paciente. Em caso de contato com os olhos: lavar com água corrente durante 15 minutos. Em caso de contato com a pele: retirar as roupas contaminadas e lavar as áreas atingidas com água e sabão. O tratamento é

sintomático, podendo incluir lavagem gástrica, administração de sulfato de atropina e reativadores da colinesterase (PAM e Contrathion).

**PERÍODOS DE CARÊNCIA:**

Não abater bovinos destinados ao consumo humano antes de passados 10 dias após o tratamento. O leite dos animais tratados não deve ser destinado para o consumo humano, antes de decorridas 72 horas da aplicação do produto.

**APRESENTAÇÃO:**

Frasco plástico autodosador contendo 1 litro.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB  
ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO  
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO,  
AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

CUIDADO



VENENO

Prazo de validade: 02 (dois) anos após a data da fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob no. 9.056 em 01/04/2005.

Responsável Técnico: Dr. Mauricio Del Bigio - CRMV-SP nº 3715.