



**Fiprolex**  
DROP SPOT

**PARA O COMBATE E CONTROLE DOS ECTOPARASITAS  
QUE INFESTAM CÃES E GATOS**

### **DESCRIÇÃO:**

O Fipronil, princípio ativo do **FIPROLEX DROP SPOT**, exerce sua ação como antagonista no receptor do GABA (ácido -amino butírico) inibindo o fluxo celular dos ions Cl<sup>-</sup> e afetando o principal mecanismo neuromodulador dos ártropodes, ao acarretar o aumento da atividade elétrica das células nervosas, causando a morte do parasita por hiperexcitação. Foi demonstrado que o Fipronil praticamente não tem afinidade com os canais de cloro dos vertebrados, o que explica sua alta segurança nos hospedeiros (cães e gatos) e no homem.

O Fipronil, quando aplicado topicamente, se distribui rapidamente através da epiderme armazenando-se nas glândulas sebáceas, sendo liberado gradualmente, via dutos foliculares.

Essa particularidade do Fipronil garante, independentemente da formulação, sua persistência em altas concentrações na cobertura pilosa de cães e gatos, garantindo sua eficácia, mesmo quando os animais são molhados ou banhados.

Os pêlos dos animais tratados, ao caírem no ambiente, exercem também significativo controle sobre as formas imaturas. Ao exercer seu efeito adulticida por contato, o Fipronil possibilita que muitas pulgas sejam mortas, até mesmo antes de realizarem seu primeiro repasto sanguíneo, sendo uma importante consideração para aqueles animais com dermatite alérgica por picada de pulga (DAPP).

### **FÓRMULA:**

Cada 100 mL contém:

Fipronil.....10,00 g

Veículo.....100,00 mL

### **INDICAÇÕES:**

**FIPROLEX DROP SPOT** é indicado no tratamento, controle e prevenção das ectoparasitoses dos cães e gatos, causadas por pulgas (*Ctenocephalides felis felis* e *Ctenocephalides canis*) e carrapatos (*Rhipicephalus sanguineus* e *Ixodes spp* - transmissor da doença de Lyme).

**FIPROLEX DROP SPOT**, possui um rápido efeito letal nas formas adultas dos ectoparasitas e através de um prolongado efeito residual, é capaz de manter os cães livres de pulgas por até 3 meses e gatos por até 5 semanas; o efeito sobre carrapatos, em ambas espécies animais, permanece por até 30 dias.

**FIPROLEX DROP SPOT** pode ser considerado um importante auxiliar no controle das infestações por cestódeos (*Dipylidium caninum*) que acometem cães e gatos, uma vez que as pulgas são hospedeiros intermediários destes parasitas. Por outro lado, o carrapato dos cães (*Rhipicephalus sanguineus*) é responsável pela transmissão da babesiose e da erlichiose canina, causadas pela *Babesia canis* e *Ehrlichia canis*, respectivamente, sendo essencial o combate do carrapato para o controle destas patologias.

### **VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:**

Uso externo, para aplicação direta sobre a pele.

Retirar a tampa da bisnaga e aplicar todo o conteúdo da mesma diretamente sobre a pele seca do animal na região da nuca ou da cernelha, para evitar que o animal se lamba. É importante afastar os pêlos para facilitar a aplicação do produto sobre a pele.

### **POSOLOGIA:**

**GATOS:** Administrar 1 bisnaga de 0,5 mL, independentemente do peso do animal.

**CÃES:** Obedecer a seguinte tabela:

<b>Peso do Animal</b>	<b>Dosagem</b>
De 1 a 10 Kg de peso	Uma bisnaga de 0,67 mL/cão
De 11 a 20 kg de peso	Uma bisnaga de 1,34 mL/cão
De 21 a 40 Kg de peso	Uma bisnaga de 2,68 mL/cão
Mais de 40 Kg de peso	Uma bisnaga de 4,02 mL/cão

### **INTERVALOS ENTRE AS APLICAÇÕES:**

**FIPROLEX DROP SPOT** mantém um prolongado efeito residual capaz de manter os cães livres de pulgas por um período de 2 a 3 meses e os gatos por até 5 semanas. Também mantém os cães livres de carrapatos por até 30 dias. Portanto, o intervalo entre as aplicações, pode variar de 1 a 3 meses, dependendo da espécie animal e do tipo de ectoparasita presente (pulga ou carrapato).

**FIPROLEX DROP SPOT** poderá ser reaplicado em intervalos menores, caso o animal esteja em ambientes muito infestados ou apresente DAPP (Dermatite Alérgica por Picada de Pulga)- sempre à critério do Médico Veterinário.

### **CONTRA INDICAÇÕES E LIMITAÇÕES DE USO:**

Não tratar filhotes de gatos com menos de 3 meses de idade nem filhotes de cães com menos de 1 Kg de peso.

### **PRECAUÇÕES GERAIS:**

Obedecer as dosagens e recomendações para uso do produto.

Evite o contato do produto com a pele.

Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto.

A higiene é fundamental. Lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário.

Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica.

Não manipular os animais até que o produto seque.

Não reutilizar as embalagens vazias. As mesmas devem ser descartadas no lixo doméstico.

### **EVENTUAIS EFEITOS SECUNDÁRIOS:**

Alguns animais, se lamberem o produto, podem apresentar um aumento na salivação. Este efeito, de curta duração, é devido à natureza dos excipientes.

### **APRESENTAÇÕES:**

Bisnagas plásticas contendo 0,5 mL para gatos e para cães 0,67; 1,34; 2,68 e 4,02 mL, embaladas em cartuchos com 1 bisnaga.

MANTENHA ESTE OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO  
FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.  
CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.

**VENDA SOB PRESCRIÇÃO E USO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO.**

Licenciado no Ministério da Agricultura sob nº 8.620 em 04/06/2003.  
Responsável técnico: Dr. Mauricio Del Bigio - CRMV nº 3715