


BLACK

22002 007 V06  
BULA PURITEC GOLD  
DATA: 21/01/10

115,00 mm



USO VETERINÁRIO

ANTIPARASITÁRIO INJETÁVEL PARA BOVINOS

#### FÓRMULA:

Cada 100 mL contém:  
Ivermectina (B<sub>1a</sub>) ..... 3,50 g  
Veículo q.s.p. .... 100,00 mL

#### INDICAÇÕES:

PURITEC GOLD é uma solução injetável de longa ação, indicada para o combate e controle dos principais parasitas internos e externos que acometem os bovinos, a saber:

Vermes gastrintestinais (adultos e larvas de 4º estágio): *Haemonchus placei*, *Trichostrongylus axei*, *Trichostrongylus colubriformis*, *Ostertagia ostertagi*, *Cooperia oncophora*, *Cooperia punctata*, *Cooperia pectinata*, *Cooperia sp.*, *Bunostomum phebotozum*, *Oesophagostomum radiatum*, *Nematodirus helvetianus*, *Nematodirus spathiger*, *Trichuris spp.* Verme pulmonar: *Dictyocaulus viviparus* (adultos e larvas de 4º estágio). Berne: Larvas da mosca *Dermatobia hominis*. Carrapatos: *Boophilus microplus*. Ácaros da sarna: *Psoroptes comunis var. bovis* e *Sarcoptes scabiei var. Bovis*. Piolhos: *Linognathus vituli*, *Haematopinus eurysternus* e *Solenopotes capillatus*.

PURITEC GOLD auxilia ainda no controle do ácaro *Chorioptes bovis*, do piolho *Damalinea bovis* e da mosca dos chifres (*Haematobia irritans*), na prevenção do desenvolvimento de bicheiras nas feridas decorrentes

das intervenções cirúrgicas de castração e descorna dos bovinos, não sendo entretanto, dispensada a observação diária. Quando a bicheira já estiver instalada, usar produtos larvicidas específicos.

#### VIA DE ADMINISTRAÇÃO E MODO DE USAR:

PURITEC GOLD deve ser administrado unicamente sob a forma de injeções subcutâneas preferencialmente na frente ou atrás da paleta, respeitando-se todas as normas de assepsia e agulhas adequadas (a critério do médico veterinário).

#### POSOLOGIA:

Deve ser administrado na dose equivalente a 0,70 mg de ivermectina (B<sub>1a</sub>) por kg de peso corporal. Esta posologia corresponde a 1 (um) mL do produto para cada 50 kg de peso corporal, conforme tabela abaixo:

PESO CORPORAL	DOSES	PESO CORPORAL	DOSES
Até 50kg	1 mL	De 301 a 350 kg	7 mL
De 51 a 100 kg	2 mL	De 351 a 400 kg	8 mL
De 101 a 150 kg	3 mL	De 401 a 450 kg	9 mL
De 151 a 200 kg	4 mL	De 451 a 500 kg	10 mL
De 201 a 250 kg	5 mL	De 501 a 550 kg	11 mL
De 251 a 300 kg	6 mL	De 551 a 600 kg	12 mL

Obs: Os animais com peso acima daqueles relacionados, deverão receber doses equivalentes a 1 mL para cada 50 kg de peso corporal. Recomenda-se que doses superiores a 10 mL sejam divididas e aplicadas em locais diferentes.

#### INTERVALO ENTRE APLICAÇÕES:

O intervalo entre os tratamentos depende do programa adotado no controle de endo e ectoparasitas da propriedade, a critério do Médico Veterinário e dos índices de reinfestação apresentados no ambiente. A formulação de ação prolongada combate e controla os parasitas por longos períodos, como segue:

*Parasitas internos: Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Ostertagia ostertagi, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, Cooperia spp., Bunostomum phebotozum, Oesophagostomum radiatum, Nematodirus helvetianus, Nematodirus spathiger, Trichuris spp:* 6 a 9 semanas.  
*Parasitas externos: Berne bovino (larvas de Dermatobia hominis):* 140 dias. Carrapato (*Boophilus microplus*): 75 dias. Ácaros da Sarna (*Psoroptes communis var. bovis* e *Sarcoptes scabiei var. bovis*): 56 dias. Controle da Mosca: *Haematobia irritans* (mosca dos chifres): 28 dias.

#### EFEITOS COLATERAIS:

PURITEC GOLD não apresentou efeitos colaterais ou secundários nas doses indicadas. O produto pode ser usado com segurança, mesmo em vacas gestantes. Em casos isolados, poderá observar-se, no animal, um desconforto passageiro após a aplicação. Eventualmente, podem ocorrer reações no local de aplicação, que desaparecem sem a necessidade de tratamento.

#### PERÍODO DE CARÊNCIA E RESTRIÇÕES DE USO:

Não abater animais destinados ao consumo humano, antes de decorridos 120 dias do último tratamento. Não utilizar o produto em fêmeas lactantes ou durante os 4 meses anteriores ao parto. Não utilizar o produto nos bovinos produtores de leite durante a fase de lactação. Não deve ser administrado pelas vias endovenosa ou intramuscular.

#### PRECAUÇÕES GERAIS:

Obedecer às dosagens e recomendações para uso do produto. Este produto deve ser administrado exclusivamente pela via subcutânea. Não fumar ou alimentar-se durante o manuseio do produto. A higiene é fundamental, lavar sempre as mãos após o manuseio de qualquer produto veterinário. Não guardar perto de alimentos, bebidas, outros medicamentos, produtos de higiene pessoal ou doméstica. Não lavar as embalagens vazias para evitar a contaminação de rios e açudes. Não reaproveitar as embalagens vazias, que devem ser destruídas por incineração.

#### APRESENTAÇÕES:

Frascos plásticos contendo 50mL, 250, 500mL e 1Litro.

**MANTENHA ESTE, OU QUALQUER OUTRO MEDICAMENTO, FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. VENDA SOB PRESCRIÇÃO E APLICAÇÃO SOB ORIENTAÇÃO DO MÉDICO VETERINÁRIO. CONSERVAR O PRODUTO EM LOCAL FRESCO E SECO, AO ABRIGO DA LUZ SOLAR.**

Data do Vencimento: (02) dois anos após a data de fabricação.

Licenciado no Ministério da Agricultura sob o nº 9121 em 27/06/2005.

Responsável Técnico:  
Dr. Maurício Del Bigio - CRMV-SP nº 3715.

Proprietário e Fabricante:  
Sespo Indústria e Comércio Ltda.  
Divisão Vetbrands Saúde Animal  
Rua Manoel Joaquim Filho, 303  
CEP: 13140-000 - Paulínia - SP  
CNPJ: 50.464.692/0001-05  
SAC: 0800 770 0355  
E-mail: vetbrands@vetbrands.com.br  
Indústria Brasileira



130,00 mm

22002 007 V06